

## Vogelarten in der Region Schaffhausen (Stand November 2018)

### Glossar

BV: Brutvogel; JV: Jahresvogel; DZ: Durchzügler;

WG: Wintergast

\*: Beobachtung im Jahr 2018

akt. Beob.: aktuelle Beobachtungsmeldung für Schaffhausen inkl. angrenzende Gebiete in ornitho.ch, Stand Nov. 2018

BP: Brutpaare bzw. Reviere im Kanton SH, nach Angaben Vogelwarte, basierend auf aktuellen Atlasdaten

hist. Beob.: historische Angaben von A. Seiler 1847, J.J. Pfeiffer 1860-80, E.A.Goeldlin 1879, C. Stemmler 1927-58

### Seetaucher

Sterntaucher\*: sehr seltener WG auf Untersee; 2 akt. Beob.(1999 Rhein bei Rheinau, 2018 Untersee bei Mammern)

Prachtaucher: seltener WG auf Untersee; 3 akt. Beob. (u.a. 1988 Rhein bei Flurlingen, 1997 Rhein bei Petri)

Eistaucher: sehr seltener WG auf Untersee; keine akt. Beob.

Gelbschnabeltaucher: Irrgast; keine akt. Beob.

### Lappentaucher

Zwergtaucher\*: spärlicher BV (11-50 BP), DZ und WG; starker Rückgang der Winterbestände seit Ende 1980er Jahre; seit 2005 stabil bzw. schwankend auf tiefem Niveau

Haubentaucher\*: spärlicher BV (11-50 BP), DZ und WG

Rothalstaucher: seltener DZ und WG; 1 akt. Beob.

Ohrentaucher: seltener DZ und WG; 1 akt. Beob.

Schwarzhalstaucher\*: spärlicher DZ und WG; 19 akt. Beob.

### Röhrennasen

Sturmschwalbe: Irrgast; eine Beob. in SH (Todfund 27.12.1999 nach Sturm «Lothar»)

### Ruderfüsser

Kormoran\*: verbreiteter Sommervogel, DZ und WG; Brutkolonien seit ca. 2000 bei Radolfzell

### Schreitvögel

Rohrdommel\*: evtl. ehem. BV (bis Anfang 20. Jhdt.), seltener DZ und WG; 7 akt. Beob. (2018 Rhein bei Wagenhausen, Flaach)

Zwergdommel\*: evtl. ehem. BV (bis Anfang 20. Jhdt.), seltener DZ und WG; 9 akt. Beob. (2018 Rhein bei Diessenhofen, Untersee bei Eschenz)

Nachtreiher\*: seltener DZ; 37 akt. Beob.

Kuhreiher: sehr seltener DZ; 3 akt. Beob. (1978, 2014, 2017)

Seidenreiher\*: seltener DZ; 43 akt. Beob. (2018 u.a. Rhein bei Büsingen, Feuerthalen, Dörflingen, Diessenhofen, Hemishofen)

Silberreiher\*: regelmässiger WG, seltener Sommergast (seit 2013 BV in CH); >1100 Beob.

Graureiher\*: spärlicher BV (11-50 BP), verbreiteter DZ und WG; Sturm «Lothar» zerstörte 1999 die Brutkolonie bei Hemishofen und zog diejenige bei Rüdlingen in Mitleidenschaft; Brutkolonie bei Ramsen (ca. 12 Horste)

Purpureiher: sehr seltener DZ; 7 akt. Beob.

Schwarzstorch\*: spärlicher DZ; 138 akt. Beob.

Weisstorch\*: ehem. BV (in der ersten Hälfte des 20. Jhdt.), regelm. DZ; Brutversuche 2014 bei Buch, 2018 bei Neunkirch; >350 akt. Beob.

Sichler: sehr seltener DZ; Erstbeob. Ende Oktober 2013 (3 diesjährige Ind.); 40 akt. Beob. (alle Meldungen beziehen sich auf die drei Ind.)

Löffler: sehr seltener DZ; einmalige Beob. (Rüdlingen)

### Entenvögel

Höckerschwan\*: eingeführter, spärlicher BV (1-10 BP) und verbreiteter WG

Zwergschwan: sehr seltener DZ und WG; 3 akt. Beob.

Singschwan: seltener DZ und WG; 21 akt. Beob.

Schwarzschan: seltener, eingeführter JV; 11 akt. Beob.

Saatgans: sehr seltener DZ und WG; keine akt., nur hist. Beob.

Blässgans: sehr seltener DZ und WG; 1 akt. Beob. (2017 Hohentwiel)

Graugans\*: spärlicher DZ und WG; 46 akt. Beob.

Weisswangengans\*: Irrgast; hist. Beob., 1 akt. Beob. (2018 Rheinau)

Ringelgans: unregelmässiger Gast; keine akt., nur 1 hist. Beob. (Carl Stemmler)

Rothalsgans: Irrgast; 1 akt. Beob.

Nilgans\*: eingeführter, seltener JV; 88 akt. Beob.; Bestandzunahme

Rostgans\*: eingeführter BV (1-10 BP); jährlich brütend u.a. am Untersee; erster Brutnachweis für SH (2014); >600 Beob.

Brandgans\*: seltener DZ und WG; 13 akt. Beob.

Mandarinente\*: eingeführter JV; 43 akt. Beob.

Pfeifente\*: regelmässiger DZ und WG; >200 akt. Beob. (v.a. Laag/Dörflingen und Untersee bei Eschenz)

Schnatterente\*: regelmässiger DZ und WG; >700 akt. Beob.; bisher kein Brutnachweis für SH

Krickente\*: regelmässiger DZ und WG; >600 akt. Beob.

Stockente\*: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG

Bahamaente: eingeführter, seltener JV; 2 akt. Beob. (2015)

Spießente\*: spärlicher DZ und WG; 69 akt. Beob.

Knäkente\*: spärlicher DZ; 66 akt. Beob.

Löffelente\*: spärlicher DZ und WG; 40 akt. Beob.  
 Kolbenente\*: seltener BV (1-10 BP, seit 1974),  
 regelmässiger DZ und WG;  
 Tafelente\*: häufiger DZ und WG (seit Ende 1960er-  
 Jahre); einziger Brutnachweis 1974 in Rüdlingen  
 Ringschnabelente: unregelmässiger, seltener Gast; 13  
 akt. Beob. (Untersee)  
 Brautente: seltener, eingeführter JV; 10 akt. Beob.  
 Moorente\*: spärlicher DZ und WG; 107 akt. Beob.; BV  
 am Untersee  
 Reiherente\*: unregelmässiger BV (1-10 BP), häufiger DZ  
 und WG (seit Ende 1960er-Jahre);  
 Bergente\*: spärlicher DZ und WG; 54 akt. Beob.  
 Eiderente: sehr seltener DZ und WG; 1 akt. Beob.  
 Eisente: seltener DZ und WG; 20 akt. Beob.  
 Schellente\*: häufiger DZ und WG; >350 akt. Beob.  
 Zwergsäger: seltener DZ und WG; 10 akt. Beob.  
 Mittelsäger: seltener DZ und WG; 7 akt. Beob.  
 Gänsesäger\*: spärlicher BV (1-10 BP, 1. Brutnachweis  
 2002 Rüdlingen, Kaminbruten Stein am Rhein);  
 häufiger DZ und WG  
 Schwarzkopfruderente: sehr seltener JV und DZ; 1 akt.  
 Beob.(2015, Untersee)

## Habichtartige

Wespenbussard\*: spärlicher BV (1-10 BP), verbreiteter  
 DZ  
 Schwarzmilan\*: spärlicher BV (11-50 BP), häufiger DZ  
 Rotmilan\*: regelmässiger BV (11-50 BP), DZ und WG;  
 grosse Winter Schlafplätze im Klettgau (bis 200 Ind.)  
 Seeadler: sehr seltener DZ und WG; 1 akt. Beob.  
 Gänsegeier: sehr seltener DZ; 7 akt. Beob. (Erstbeob.  
 2006)  
 Schlangenadler: sehr seltener DZ; hist. Beob.; 4 akt.  
 Beob.  
 Rohrweihe\*: spärlicher DZ; >230 akt. Beob.; ehem. BV  
 am Untersee, evtl. 1878 im Schaaren  
 Kornweihe\*: regelmässiger DZ und WG; >230 akt. Beob.  
 Steppenweihe: sehr seltener DZ; 4 akt. Beob.  
 Wiesenweihe\*: extrem seltener BV (1 BP 2007  
 Klettgau); seltener DZ; 133 akt. Beob.  
 Habicht\*: spärlicher BV (11-50 BP), DZ und WG  
 Sperber\*: spärlicher BV (11-50 BP), DZ und WG  
 Mäusebussard\*: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG  
 Raufussbussard: sehr seltener, unregelmässiger DZ und  
 WG; 1 akt. Beob.  
 Schelladler: sehr seltener DZ und WG; Erstbeob. 1996 in  
 Büsingen; besondertes Ind. überflog Region im Nov.  
 2017  
 Steinadler: spärliche Beob. umherstreifender Ind.; 43  
 akt. Beob.; Zunahme in den letzten Jahren  
 Fischadler\*: ehem. BV (letzte Bruten Südranden/  
 Hochrhein bis 1919); regelm. DZ; 129 akt. Beob.;  
 Anzahl Beob. und Aufenthaltsdauer einzelner Ind.  
 nehmen zu

Turmfalke\*: verbreiteter BV (51-200 BP), DZ und WG  
 Rotfussfalke: seltener DZ (v.a. in Maikäferjahren); 28 akt.  
 Beob.  
 Merlin: seltener DZ und WG; 18 akt. Beob.  
 Baumfalke\*: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ  
 Wanderfalke\*: spärlicher BV (1-10 BP), DZ und WG;  
 alljährlich brütend seit 1996

## Hühnervögel

Haselhuhn: ehem. BV; letzte Brutnachweise 1960er-  
 Jahre  
 Birkhuhn: evtl. ehem. BV  
 Auerhuhn: ehem. BV; letzter Brutnachweis 1932 Randen  
 Rebhuhn: ehem. BV; letzter Brutnachweis 1992;  
 erfolgloses Wiederansiedlungsprojekt; 85 akt. Beob.  
 Wachtel\*: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ;  
 Invasionsvogel; >300 akt. Beob.  
 Jagdfasan\*: eingeführter, seltener JV (1-10 BP); 84 akt.  
 Beob.

## Kranichvögel

Wasserralle\*: seltener BV (1-10 BP), DZ und WG; 240  
 akt. Beob.  
 Tüpfelsumpfhuhn\*: ehem. BV (bis ca. 1950); seltener  
 DZ; 5 akt. Beob. (u.a. 2015, 2018 bei Buchberg)  
 Kleines Sumpfhuhn: evtl. ehem. BV; sehr seltener DZ; 1  
 akt. Beob. (2014 Petri)  
 Zwergsumpfhuhn: evtl. ehem. BV; keine akt. Beob.  
 Wachtelkönig: ehem. BV (letzte Brutnachweise Ende 19.  
 Jhdt.); seltener DZ; 4 akt. Beob.  
 Teichhuhn\*: seltener BV (1-10 BP), DZ und WG  
 Blässhuhn\*: verbreiteter BV (51-200 BP), DZ und WG  
 Kranich\*: seit wenigen Jahren zunehmend  
 regelmässiger DZ; 124 akt. Beob.

## Watvögel, Möwen und Seeschwalben

Austernfischer\*: seltener DZ; 2 hist. Beob. (Carl  
 Stemmler); 2 akt. Beob. (2015 Untersee, 2018 bei  
 Hemishofen)  
 Stelzenläufer: sehr seltener DZ; 8 akt. Beob.  
 Triel: sehr seltener DZ; 1 hist. Beob. (Goeldlin)  
 Flussregenpfeifer\*: ehem BV, spärlicher DZ; 109 akt.  
 Beob.  
 Sandregenpfeifer\*: seltener DZ; 4 akt. Beob. (u.a. 2015,  
 2018 bei Eschenz)  
 Mornellregenpfeifer: sehr seltener DZ; 6 akt. Beob.  
 Goldregenpfeifer\*: seltener DZ; 17 akt. Beob. (2018 97  
 Ind.!)  
 Kiebitzregenpfeifer\*: seltener DZ; 11 akt. Beob. (2015  
 Untersee, 2018 bei Hemishofen)  
 Kiebitz\*: ehem. BV; häufiger DZ, seltener WG; letzte  
 erfolgreiche Brut 1989 im Klettgau; >200 akt. Beob.  
 Knutt: sehr seltener DZ; 2 akt. Beob. (2014, 2015  
 Untersee)

Zwergstrandläufer: sehr seltener DZ; 2 akt. Beob. (2015, Untersee)  
Temminckstrandläufer: sehr seltener DZ; 1 akt. Beob. (2015, Untersee)  
Alpenstrandläufer\*: seltener DZ; 11 akt. Beob. (u.a. 2016, Untersee)  
Kampfläufer\*: seltener DZ; 10 akt. Beob. (u.a. 2015, 2018 Untersee)  
Zwergschnepfe\*: seltener DZ und WG; 15 akt. Beob. (u.a. 2016, 2017, 2018 bei Eschenz)  
Bekassine\*: verm. ehem. BV (bis 1950er-Jahre, Carl Stemmler); regelmässig, spärlicher DZ; >200 akt. Beob. (2018 bis 25 Ind.!)  
Waldschnepfe\*: seltener, unregelm. BV (1-10 BP, seit 2016 wieder alljährlich Brutzeitbeob.); spärlicher DZ; 57 akt. Beob.  
Uferschnepfe: sehr seltener DZ; keine akt. Beob.  
Pfuhschnepfe: sehr seltener DZ; 4 akt. Beob. (v.a. Untersee)  
Regenbrachvogel: sehr seltener DZ; 3 akt. Beob.  
Grosser Brachvogel\*: evtl. ehem. BV (Goeldlin); spärlicher DZ und WG; 19 akt. Beob.  
Dunkler Wasserläufer\*: sehr seltener DZ; 6 akt. Beob. (u.a. 2015, 2018 bei Eschenz)  
Rotschenkel: seltener DZ; 10 akt. Beob.  
Grünschenkel\*: spärlicher DZ; 83 akt. Beob.  
Waldwasserläufer\*: regelmässiger DZ und WG; >450 akt. Beob.  
Bruchwasserläufer\*: spärlicher DZ; 66 akt. Beob. (u.a. 2015, 2018 bei Eschenz)  
Flussuferläufer\*: regelmässiger DZ; >300 akt. Beob.  
Steinwälder: sehr seltener DZ; 1 akt. Beob. (2015 Untersee)  
Odinshühnchen\*: sehr seltener DZ; Erstbeobachtung 2018 bei Eschenz; 59 akt. Beob. (1 Ind. 27.8.-2.9.)  
Falkenraubmöwe: sehr seltener DZ; eine hist. Angabe (Carl Stemmler); 1 akt. Beob. (2016 Bargaen)  
Schwarzkopfmöwe\*: seltener DZ und WG; 13 akt. Beob. (u.a. bei Hemishofen und Eschenz)  
Präriemöwe: Irrgast; Schweizer Erstbeobachtung 2006 in SH  
Zwergmöwe: sehr seltener DZ; 1 akt. Beob.  
Lachmöwe\*: häufiger DZ und WG  
Sturmmöwe\*: häufiger DZ und WG  
Heringsmöwe\*: spärlicher DZ und WG; 59 akt. Beob. (v.a. Untersee)  
Silbermöwe\*: spärlicher DZ und WG; 72 akt. Beob. (v.a. Untersee)  
Mittelmeermöwe\*: häufiger DZ, Winter- und Sommergast; >1000 akt. Beob.  
Steppenmöwe\*: regelmässiger DZ und WG; >200 akt. Beob.  
Mantelmöwe\*: seltener DZ und WG; 10 akt. Beob. (v.a. Untersee)  
Dreizehenmöwe: sehr seltener DZ und WG; 2 akt. Beob. (2017 Rhein bei Neuhausen)

Raubseeschwalbe\*: seltener DZ; 14 akt. Beob. (2013, 2015, 2018 bei Eschenz)  
Flussseeschwalbe\*: regelmässiger DZ; 118 akt. Beob.  
Trauerseeschwalbe\*: spärlicher DZ; 47 akt. Beob.

## Tauben

*Strassentaube\**: verbreiteter, eingeführter JV (>200 BP)  
*Hohltaube\**: spärlicher BV (51-200 BP) und DZ  
*Ringeltaube\**: häufiger BV (>200 BP) und DZ (Tagessumme >40'000); starke Zunahme im Siedlungsbereich zulasten Türkentaube  
*Türkentaube\**: spärlicher JV (51-200 BP); Mitte 20. Jhdt. eingewandert, eroberte nicht alle Ortschaften in SH; Bestandsabnahme; >250 akt. Beob.  
*Turteltaube\**: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ; Bestandsabnahme; 226 akt. Beob.

## Kuckucke

*Kuckuck\**: spärlicher BV (1-10 Reviere) und DZ; Bestandsabnahme

## Eulen

*Schleiereule\**: seltener BV (1-10 BP), DZ und WG  
*Zwergohreule\**: seltener DZ; hist. Beob. (Pfeiffer), 11 akt. Beob.  
*Uhu\**: selten brütender JV (1-10 BP); Brutvorkommen erloschen Mitte des 20. Jhdt., regelm. brütend wieder seit 2005  
*Sperlingskauz\**: selten brütender JV (1-10 BP); Brutnachweise 2016/2017; 86 akt. Beob.  
*Steinkauz*: ehem. BV (letzte erfolgreiche Brut 1977 in Löhningen); 4 akt. Beob.  
*Waldkauz\**: verbreitetet brütender JV (51-200 BP)  
*Waldohreule\**: spärlicher BV (11-50 BP), DZ und WG  
*Sumpfohreule*: seltener DZ; 6 akt. Beob.  
*Raufusskauz*: sehr seltener, unregelm. brütender JV; 1-10 BP (3 Bruten 2000); 8 akt. Beob.

## Nachtschwalben

Ziegenmelker: ehem. BV (Ende 19. Jhdt)

## Segler

*Mauersegler\**: häufiger BV (>200 BP) und DZ;  
*Alpensegler\**: spärlicher BV (11-50 BP, seit ca. 1920, nur Stadt SH) und DZ

## Rackenvögel

*Eisvogel\**: seltener BV (1-10 BP), DZ und WG  
*Bienenfresser\**: sehr seltener, unregelm. BV (erste Brut in SH 2011) und DZ; 22 akt. Beob.  
*Blauracke*: hist. Angaben, 1 akt. Beob. (2016)  
*Wiedehopf\**: sehr seltener, unregelm. BV (regelm. bis 1987, vereinzelt wieder ab 2011), spärlicher DZ; 105 akt. Beob.

## Spechte

*Wendehals\**: seltener BV (1-10 BP) und DZ;  
Bestandsrückgang  
*Grauspecht\**: spärlich brütender JV (11-50 BP)  
*Grünspecht\**: verbreitet brütender JV (51-200 BP)  
*Schwarzspecht\**: verbreitet brütender JV (51-200 BP)  
*Buntspecht\**: häufig brütender JV (>200 BP)  
*Mittelspecht\**: verbreitet brütender JV (51-200 BP);  
Bestandsrückgang seit 1970er-Jahre, in den letzten  
Jahren Trendumkehr und klare Bestandszunahme  
*Kleinspecht\**: spärlich brütender JV (11-50 BP)  
Dreizehenspecht: unsichere hist. Angaben

## Singvögel

Kalenderlerche: unsichere hist. Angaben  
Haubenlerche: ehem. BV (letzter Brutnachweis 1925)  
*Heidelerche\**: spärlicher BV (11-50 BP; v.a.  
Randenhochflächen, bis 1994 und erneut ab 2014  
Klettgauer Rebberge), verbreiteter DZ  
*Feldlerche\**: häufiger BV (>200 BP), DZ und spärlicher  
WG; Klettgau hat schweizweit eine der grössten  
Bestände in hoher Dichte (bis 30 Reviere/km<sup>2</sup>)  
*Uferschwalbe\**: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ; ehem.  
in den Kiesgruben v.a. im Klettgau häufig, aktuell nur  
noch in wenigen Gruben (u.a. Solenberg)  
*Felsenschwalbe*: sehr seltener DZ; Erstbeobachtung 2014  
(Stadt SH); 2 akt. Beob.  
*Rauchschwalbe\**: häufiger BV (>200 BP) und DZ;  
Bestandsrückgang  
*Mehlschwalbe\**: häufiger BV (>200 BP) und DZ;  
Bestandsrückgang; Förderung u.a. mit  
Schwalbenhotels  
Brachpieper: spärlicher DZ; 70 akt. Beob.  
*Baumpieper\**: verbreiteter BV (51-200 BP,  
Randenhochflächen) und DZ  
*Wiesenpieper\**: häufiger DZ, spärlicher WG; >200 akt.  
Beob.  
Rotkehlpieper: seltener DZ; 10 akt. Beob.  
*Bergpieper\**: häufiger DZ, spärlicher WG; >250 akt.  
Beob.  
*Schafstelze\**: spärlicher BV (11-50 BP; ab den 1960er-  
Jahren v.a. im Oberen Kantonsteil), häufiger DZ;  
Bestandsrückgang  
*Gebirgsstelze\**: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ  
*Bachstelze\**: häufiger BV (>200 BP) und DZ  
Seidenschwanz: seltener DZ und WG; 108 akt. Beob.  
*Wasseramsel\**: spärlich brütender JV (11-50 BP, an  
Wutach, Durach, Biber, Rhein)  
*Zaunkönig\**: häufig brütender JV (>200 BP)  
*Heckenbraunelle\**: häufiger BV (>200 BP) und DZ  
*Alpenbraunelle\**: seltener WG (2018 Hohentwiel)  
*Rotkehlchen\**: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG  
*Nachtigall\**: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ;  
Blaukehlchen\*: spärlicher DZ; 11 akt. Beob.

*Hausrotschwanz\**: häufiger BV (>200 BP) und DZ,  
spärlicher WG;  
*Gartenrotschwanz\**: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ;  
starker Bestandsrückgang (grenznah lokal noch in  
hoher Dichte); >200 akt. Beob.  
*Braunkehlchen\**: ehem. BV (letzte Brut 1970er-Jahre);  
häufiger DZ; >300 akt. Beob.  
*Schwarzkehlchen\**: spärlicher BV (11-50 BP, regelm.  
brütend seit 1998), häufiger DZ  
*Steinschmätzer\**: ehem. unregelmässiger BV (u.a. 1960),  
häufiger DZ; >300 akt. Beob.  
*Ringdrossel\**: seltener DZ; 17 akt. Beob.  
*Amsel\**: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG  
*Wacholderdrossel\**: häufiger BV (51-200 BP), DZ und  
WG; Anfang des 20. Jhdts. als BV eingewandert  
*Singdrossel\**: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher  
WG  
*Rotdrossel\**: häufiger DZ, spärlicher WG; >100 akt.  
Beob.  
*Misteldrossel\**: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher  
WG  
*Feldschwirl\**: sehr seltener, unregelm. BV (1-10 BP, bis  
Ende 1980er-Jahre), spärlicher DZ; 70 akt. Beob.  
*Rohrschwirl*: seltener DZ; 1 akt. Beob.  
*Schilfrohrsänger*: evtl. ehem. BV; seltener DZ; 1 akt.  
Beob.  
*Sumpfrohrsänger\**: spärlicher BV (51-200 BP), häufiger  
DZ  
*Teichrohrsänger\**: spärlicher BV (51-200 BP), häufiger  
DZ  
*Drosselrohrsänger\**: ehem. BV (letzte Brut 1975  
Rüdlingen), spärlicher DZ; 14 akt. Beob.  
*Gelbspötter\**: ehem. BV, spärlicher DZ;  
Bestandsrückgang; 22 akt. Beob.  
*Orpheusspötter\**: seltener, unregelm. BV, spärlicher DZ;  
Erstbeob. Hallau 2009; 13 akt. Beob.  
*Klappergrasmücke\**: spärlicher BV (11-50 BP), häufiger  
DZ; >200 akt. Beob.  
*Dorngrasmücke\**: verbreiteter BV (51-200 BP),  
regelmässiger DZ; Bestandsrückgang ab 1980er-  
Jahren, seit einigen Jahren wieder Bestandszunahme  
*Gartengrasmücke\**: häufiger BV (>200 BP) und DZ  
*Mönchsgrasmücke\**: häufiger BV (>200 BP) und DZ,  
seltener WG  
*Berglaubsänger\**: verbreiteter BV (51-200 BP, Randen)  
und DZ; >200 akt. Beob.  
*Waldlaubsänger\**: verbreiteter BV (51-200 BP) und DZ;  
>200 akt. Beob.; signifikanter Bestandsrückgang  
*Zilpzalp\**: häufiger BV (>200 BP) und DZ, seltener WG  
*Fitis\**: spärlicher BV (11-50 BP) und DZ  
*Wintergoldhähnchen\**: häufiger BV (>200 BP), DZ und  
WG  
*Sommergoldhähnchen\**: häufiger BV (>200 BP), DZ und  
spärlicher WG  
*Grauschnäpper\**: häufiger BV (>200 BP) und DZ

Zwergschnäpper: sehr seltener DZ; einzige Beob. 1982 Bagen

Trauerschnäpper\*: verbreiteter BV (51-200 BP) und DZ

Bartmeise\*: seltener DZ und WG; 3 akt. Beob. (2016, 2018)

Schwanzmeise\*: verbreitet brütender JV (>200 BP)

Sumpfmeise\*: häufig brütender JV (>200 BP)

Mönchsmeise (Weidenmeise)\*: seltener DZ; isoliertes Brutvorkommen in Blumberg/D (Erstnachweis 2014); 12 akt. Beob.

Haubenmeise\*: häufig brütender JV (>200 BP)

Tannenmeise\*: häufig brütender JV (>200 BP)

Blaumeise\*: häufig brütender JV (>200 BP), v.a. unterhalb 700 m ü.M.

Kohlmeise\*: häufig brütender JV (>200 BP)

Kleiber\*: häufig brütender JV (>200 BP)

Mauerläufer\*: seltener WG; 22 akt. Beob. (Hohentwiel)

Waldbaumläufer\*: häufig brütender JV (>200 BP)

Gartenbaumläufer\*: häufig brütender JV (>200 BP)

Beutelmeise\*: seltener DZ; 6 akt. Beob.

Pirol\*: verbreiteter BV (51-200 BP v.a. entlang Rhein und im Klettgau), häufiger DZ;

Neuntöter\*: verbreiteter BV (51-200 BP) und häufiger DZ; Bestandsrückgang von 1960-1980, ab 1990-2010 Trendumkehr, aktuell wieder Bestandsrückgang

Schwarzstirnwürger: ehem. BV (letzte Brut Anfang 20. Jhd.); keine akt. Beob.

Raubwürger\*: ehem. BV (letzte Brut 1970er-Jahre); spärlicher DZ und WG (v.a. seit 2000); 153 akt. Beob.

Rotkopfwürger: ehem. BV (letzte Brut Ende 1980er-Jahre, 1991 Brutverdacht bei Schleithem), seltener DZ; 4 akt. Beob.

Eichelhäher\*: häufig brütender JV (>200 BP)

Elster\*: häufig brütender JV (51-200 BP)

Tannenhäher: unregelmässiger BV (letztmals 1987 bei Schleithem); seltener DZ; 18 akt. Beob.

Dohle\*: spärlich brütender JV (11-50 BP), DZ und WG; Gebäudebruten in Stadt SH; Baumbruten u.a. Bagen, Beggigen

Saatkrähe\*: spärlich brütender JV (11-50 BP, seit 2009), häufiger DZ und WG;

Raben-/Nebelkrähe\*: häufig brütender JV (>200 BP); Nebelkrähe nur selten beobachtet

Kolkrahe\*: spärlich brütender JV (11-50 BP, regelm. seit 1990); Bestandszunahme

Star\*: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher WG

Haussperling\*: häufig brütender JV (>200 BP)

Feldsperling\*: häufig brütender JV (>200 BP)

Buchfink\*: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG

Bergfink\*: häufiger DZ und WG z.t. in grossen Schwärmen; >350 akt. Beob.

Girlitz\*: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher WG

Zitronengirlitz: seltener DZ; 2 akt. Beob. (u.a. 2015)

Grünfink\*: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG

Stieglitz\*: häufiger BV (>200 BP) und DZ, spärlicher WG

Erlenzeisig\*: verbreiteter DZ und WG; >450 akt. Beob.

Bluthänfling\*: verbreiteter BV (51-200 BP) und DZ; Bestandsrückgang

Alpen-/Taigabirkenzeisig: spärlicher DZ und WG; 38 akt. Beob.

Fichtenkreuzschnabel\*: verbreiteter BV (51-200 BP), DZ und WG

Gimpel\*: verbreitet brütender JV (>200 BP)

Kernbeisser\*: verbreiteter BV (>200 BP), DZ und WG

Goldammer\*: häufiger BV (>200 BP), DZ und WG;

Zaunammer\*: seltener BV (1-10 BP), spärlicher DZ und WG; Brutzeitbeob. u.a. 1983, 1995, seit 2013 alljährlich; 108 akt. Beob.;

Zippammer\*: seltener DZ (2018 Schaffhausen, Hohentwiel); 3 akt. Beob.

Ortolan\*: spärlicher DZ; 42 akt. Beob.

Rohrhammer\*: spärlicher BV (11-50 BP) und WG, häufiger DZ

Graunammer\*: seltener BV (1-10 BP), DZ und WG; Bestandsabnahme von 1980 - 1995, dann Trendumkehr, aktuell wieder Bestandsrückgang; >800 akt. Beob.

#### Quellen (Auswahl)

Goeldlin, Emil August (1879): Verzeichnis der im Kanton Schaffhausen vorkommenden Vögel. Journal für Ornithologie 27, 357-385.

Härdi, M. & U. Thalmann (o.J.): Rettet die Vögel! Dokumentation der Bestandsentwicklung seltener Vogelarten im Kanton Schaffhausen (Schweiz) von Anfang bis Ende des 20. Jahrhunderts. Typoskript.

Maumary, L., L. Vallotton & P. Knaus (2007): Die Vögel der Schweiz. Schweiz. Vogelwarte, Sempach und Nos Oiseaux, Montmolin.

Nabulon, T. et al. (2003): Brutvögel im Kanton Schaffhausen. Neujahrsblatt natf. Ges. SH

Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen (o.J.): ornithologische Beobachtungen. Zettelkatalog.

Pfeiffer, Johann Jacob (o.J.): Allerlei Beobachtungen über die Tierwelt des Kantons Schaffhausen, 1856-1880. Manuskript.

Roost, M. & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2002. Typoskript.

Roost, M. & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2003. Typoskript.

Roost, M., S. Trösch & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2004. Typoskript.

Roost, M., S. Trösch & M. Widmer (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2005. Typoskript.

Seiler, Alexander (1847): Uebersicht der im Canton Schaffhausen vorkommenden Thiere. Verh. natf. Ges., 160-175.

Stemmler, Carl (o.J.): Die Vögel von Schaffhausen und Umgebung. Typoskript, 7 Bd.

Widmer, M. (1995): Zusammenstellung der ornithologischen Beobachtungen 1993. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 40, 89-109.

Widmer, M. & R. Marti (o.J.): Beobachtungen 1988. Ornithologische Arbeitsgruppe Schaffhausen. Typoskript.

Widmer, M. & R. Marti (1991): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1990. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 36, 83-96.

- Widmer, M., R. Marti & M. Roost (1992): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1991. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 37, 35-50.
- Widmer, M., R. Marti & M. Roost (1993): Ornithologische Beobachtungen 1989. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 35, 69-90.
- Widmer, M., R. Marti & S. Trösch (1990): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1990. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 36, 83-96.
- Widmer, M. & M. Roost (2003): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2000. Typoskript.
- Widmer, M. & M. Roost (o.J.): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 2001. Typoskript.
- Widmer, M. & U. Weibel (1994): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1994. Typoskript.
- Widmer, M. & U. Weibel (1995): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1995. Typoskript.
- Widmer, M. & U. Weibel (1996): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1996. Typoskript.
- Widmer, M. & U. Weibel (1998): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1997. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 43, 73-88.
- Widmer, M. & U. Weibel (1999): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1998. Mitt. natf. Ges. Schaffh. 44, 277-295.
- Widmer, M. & U. Weibel (2001): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1999. Typoskript.
- [www.ornitho.ch](http://www.ornitho.ch) (4. Nov. 2017)

Verfasser: Urs Weibel unter Mitarbeit von Pascal Parodi,  
Martin Roost, Stephan Trösch und Michael Widmer  
Stand November 2018